



Czego należy spodziewać się po szczepieniu

Jakich skutków ubocznych można się spodziewać po zaszczepieniu się na COVID-19?

Skutki uboczne, jakie wystąpiły po podaniu szczepionki COVID-19 obejmują:

- Ból w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk lub zaczerwienienie
- Ból mięśni lub stawów
- Ogólne złe samopoczucie
- Zmęczenie
- Gorączkę lub dreszcze
- Obrzęk węzłów chłonnych
- Ból głowy
- Nudności lub wymioty

Skutki uboczne są częściej zgłaszane po podaniu drugiej dawki szczepionki i występują częściej u osób poniżej 55 roku życia.

Te skutki uboczne są zwykle łagodne lub umiarkowane, ale w rzadkich przypadkach mogą być bardziej nasilone.

Badania nad szczepionkami są w toku, więc możliwe są inne skutki uboczne.

O jakich skutkach ubocznych należy wiedzieć?

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że szczepionka może wywołać ciężką reakcję alergiczną, zwykle występującą w ciągu kilku minut do godziny po podaniu szczepionki. Objawy mogą obejmować trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub gardła, szybkie bicie serca, wysypkę, zawroty głowy lub osłabienie.

Badania nad szczepionkami nadal trwają, dlatego mogą wystąpić inne poważne i nieoczekiwane skutki uboczne.

Co należy zrobić, jeśli wystąpią skutki uboczne?

Jeśli wystąpi ciężka reakcja alergiczna (trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub gardła, szybkie bicie serca, zawroty głowy lub osłabienie), **należy zadzwonić pod numer 911 lub udać się do najbliższego szpitala.**

W przypadku uporczywych lub nie ustępujących skutków ubocznych, należy skontaktować się z lekarzem.

Uwaga: W przypadku osób ubezpieczonych, ubezpieczenie zostanie obciążone kosztami szczepionki i otrzymają one Wyjaśnienie świadczeń (ang. Explanation of Benefits, EOB). W przypadku pacjentów posiadających Medicare Advantage, rachunek zostanie przesłany do Medicare.

